

NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ

Hlívá růžová

Děkujeme, že jste si zakoupili naočovaný blok se substrátem z Urban Fungi.

Substrát je tvořen pilinami z tvrdého dřeva a příměsí obilných živin. Naočkován je houbou **Hlívá růžová** (*Pleurotus salmonostramineus*) a je již plně prorostlý a připravený plodit v případě, že jsou již patrné zárodky plodnic. Ty můžete odstranit z povrchu substrátu.

Nůžkami ustříhnete plastový kontejner v horní části. Slože jej jako obálku směrem dovnitř bloku substrátu, aby jste omezili přístup vzduchu. Blok na boku dezinfikujte a nařízněte ve tvaru písmene X cca 10 cm. Tudy poroste plodnice. Můžete lehce kropit řez vodou, dokud se neobjeví růžové plodnice houby.

Takto připravený blok umístěte na místo bez přímého slunečního svitu, ovšem s dostatkem světla (tak, aby bylo možno číst) a s optimální teplotou **18°-30°C** a vlhkostí vzduchu **85-90%**. (Pro udržení vlhkosti můžete zapíchnout 4 špejle do rohů bloku a přikrýt je průhledným igelitem – takto vznikne malý pěstební stan, který bude držet vlhkost, případně blok umístěte pod průhledný kontejner/krabici). Zabezpečte dostatečnou výměnu vzduchu častým větráním několikrát denně.

Plodnice sklízíte během dalších 3-5 dnů, nebo když se plodnicím začne měnit barva okraje klobouku. Odstraňte všechny plodnice.

Po sklizni nechte blok odpočinout 10 dní. Substrát navlhčete a zabalte zpět do pytle – vyhrňte nahoru a založte jako obálku. Uložte do místnosti s teplotou **20°C**. Vyčkejte dokud se opět nazačnou tvořit zárodky plodnic a opakujte pěstební postup. Každý blok by měl plodit 2 sklizně.



www.urbanfungi.cz