

NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ

Hlíva královská - Eryngii

Děkujeme, že jste si zakoupili naočovaný blok se substrátem z Urban Fungi.

Substrát je tvořen pilinami z tvrdého dřeva a příměsí obilných živin. Naočován je houbou **Hlíva královská/máčková - Eryngii** (*Plerurotus eryngii*) a je již plně prorostlý a připravený plodit v případě, že jsou již patrné zárodky plodnic.

Nůžkami ustříhnete plastový kontejner v horní části. Takto vzniklý rukáv složte dolů a nechte cca 5cm nad povrchem substrátu, aby vytvořil jakousi ohrádku. Povrch substrátu pravidelně kropte vodou, houby však nikdy nekropte přímo. Pak již udržujte jen vzdušnou vlhkost.

Takto připravený blok umístěte na místo bez přímého slunečního svitu, ovšem s dostatkem světla (tak, aby bylo možno číst) a s optimální teplotou **16°-18°C** a vlhkostí vzduchu **85-90%**. (Pro udržení vlhkosti můžete zapíchnout 4 špejle do rohů bloku a přikrýt je průhledným igelitem – takto vznikne malý pěstební stan, který bude držet vlhkost, případně blok umístěte pod průhledný kontejner/krabici). Zabezpečte dostatečnou výměnu vzduchu častým větráním několikrát denně.

Plodnice sklízíte během dalších 4-8 dnů, nebo když se plodnicím začnou zvedat okraje klobouku. Odstraňte všechny plodnice.

Po sklizni nechte blok odpočinout 14 dní. Substrát navlhčete a zabalte zpět do pytle – vyhrňte nahoru a založte jako obálku. Uložte do místnosti s teplotou **10-15°C**. Vyčkejte dokud se opět nazačnou tvořit zárodky plodnic (to může trvat dva až tři týdny) a opakujte pěstební postup. Každý blok by měl plodit 2-3 sklizně.



www.urbanfungi.cz

NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ

Hlíva královská - Eryngii

Děkujeme, že jste si zakoupili naočovaný blok se substrátem z Urban Fungi.

Substrát je tvořen pilinami z tvrdého dřeva a příměsí obilných živin. Naočován je houbou **Hlíva královská/máčková - Eryngii** (*Plerurotus eryngii*) a je již plně prorostlý a připravený plodit v případě, že jsou již patrné zárodky plodnic.

Nůžkami ustříhnete plastový kontejner v horní části. Takto vzniklý rukáv složte dolů a nechte cca 5cm nad povrchem substrátu, aby vytvořil jakousi ohrádku. Povrch substrátu pravidelně kropte vodou, houby však nikdy nekropte přímo. Pak již udržujte jen vzdušnou vlhkost.

Takto připravený blok umístěte na místo bez přímého slunečního svitu, ovšem s dostatkem světla (tak, aby bylo možno číst) a s optimální teplotou **16°-18°C** a vlhkostí vzduchu **85-90%**. (Pro udržení vlhkosti můžete zapíchnout 4 špejle do rohů bloku a přikrýt je průhledným igelitem – takto vznikne malý pěstební stan, který bude držet vlhkost, případně blok umístěte pod průhledný kontejner/krabici). Zabezpečte dostatečnou výměnu vzduchu častým větráním několikrát denně.

Plodnice sklízíte během dalších 4-8 dnů, nebo když se plodnicím začnou zvedat okraje klobouku. Odstraňte všechny plodnice.

*Po sklizni nechte blok odpočinout 14 dní. Substrát navlhčete a zabalte zpět do pytle – vyhrňte nahoru a založte jako obálku. Uložte do místnosti s teplotou **10-15°C**. Vyčkejte dokud se opět nazačnou tvořit zárodky plodnic (to může trvat dva až tři týdny) a opakujte pěstební postup. Každý blok by měl plodit 2-3 sklizně.*



urbanfungi@post.cz tel. 776 377 161

www.urbanfungi.cz