

# NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ

## HOUŽEVNATEC JEDLÝ – SHII TAKE

Děkujeme, že jste si zakoupili naočovaný blok se substrátem z Urban Fungi.

Substrát je tvořen pilinami z tvrdého dřeva a příměsí obilných živin. Naočkován je houbou **Houževnatec jedlý – Shii take (*Lentulina edodes*)** a je již plně prorostlý a připravený plodit v případě, že jsou již patrné zárodky plodnic. Substrát na 7 dní uložte při teplotě **10°-15°C**

Před otevřením pytle se substrátem několikrát upustěte na zem z výšky cca 40 cm. Tím se blok aktivuje k růstu plodnic. Sáček ve výšce 1 cm nade dnem odřízněte po obvodu a vytáhněte ze sáčku. V takto vytvořené misce nechjte blok substrátu. Pravidelně hodně kropte vodou, dokud se nezačnou tvořit hlavičky plodnic.

Takto připravený blok umístěte na místo bez přímého slunečního svitu, ovšem s dostatkem světla (tak, aby bylo možno číst) a s optimální teplotou **12°-20°C** a vlhkostí vzduchu **85-90%**. (Pro udržení vlhkosti můžete zapíchnout 4 špejle do rohů bloku a přikrýt je průhledným igelitem – takto vznikne malý pěstební stan, který bude držet vlhkost, případně blok umístěte pod průhledný kontejner/krabici). Zabezpečte dostatečnou výměnu vzduchu častým větráním několikrát denně.

Plodnice sklízíte během dalších 5-8 dnů, nebo když se plodnicím začne měnit barva okraje klobouku. Odstraňte všechny plodnice.

Po sklizni nechte blok odpočinout 14 dní. Před druhou sklizní substrát na 12 h ponořte do studené vody a nechte nasáknout. Uložte zpět na pěstební místo a opakujte pěstební postup. Každý blok by měl plodit 2-3 sklizně.

